

## Dénomination du médicament

### ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème Aciclovir

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 10 jours.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème ?
3. Comment utiliser ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

### 1. QU'EST-CE QUE ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - code ATC : D06BB03

ANTIVIRAL A USAGE TOPIQUE

Ce médicament est indiqué dans le traitement des poussées d'Herpès labial localisé (appelé aussi "bouton de fièvre") chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème ?

## **N'utilisez jamais ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème :**

- si vous êtes allergique à l'aciclovir ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,
- chez l'enfant de moins de 6 ans,
- En application dans l'œil, dans la bouche, dans le vagin.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère avant d'utiliser ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème.

## **Faites attention avec ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème :**

- Prenez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin en cas de doute sur la nature de votre lésion.
- En cas d'absence de cicatrisation au bout de 10 jours de traitement ou d'aggravation de votre bouton de fièvre, arrêtez le traitement et prenez un avis médical.
- En cas de poussée d'Herpès labial, quelques précautions d'hygiène s'imposent, pour protéger votre entourage du **risque de transmission du virus**.
  - o évitez le contact rapproché, un baiser par exemple, avec votre entourage, et **n'embrassez jamais un enfant en bas âge**,
  - o lavez-vous soigneusement les mains en cas de contact avec la lésion,
  - o au cours du traitement, afin de ne pas propager les lésions, ne frottez ni vos yeux ni vos paupières avec vos mains et si vous portez des lentilles de contact, ne les humidifiez jamais avec votre salive,
  - o évitez de toucher ou de gratter les lésions.

En cas d'une autre localisation de votre crise d'herpès, n'utilisez jamais cette crème, prenez l'avis de votre médecin

## **Enfants et adolescents**

N'utilisez pas cette crème chez l'enfant de moins de 6 ans.

## **Autres médicaments et ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Il est déconseillé d'utiliser ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème avec d'autres crèmes.

## **ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème avec des aliments et boissons et de l'alcool**

Sans objet.

## **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

## **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

## **ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème contient du propylèneglycol**

Ce médicament contient 150 mg de propylèneglycol par gramme de crème.

## **ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème contient de l'alcool cétylique**

Ce médicament contient de l'alcool cétylique et peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple dermatite de contact).

### **3. COMMENT UTILISER ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème ?**

#### **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

##### **Mode et voie d'administration**

Voie cutanée.

RESERVE A L'USAGE EXTERNE.

##### **Posologie**

Appliquez la crème sur les lésions et autour des lésions, 5 fois par jour.

Le traitement étant plus efficace s'il est commencé dès les premiers symptômes annonçant une poussée d'herpès labial (bouton de fièvre), débutez les applications dès les premières démangeaisons ou brûlures avant même que n'apparaissent les vésicules.

Lavez-vous les mains soigneusement avant et après application de la crème sur votre bouton de fièvre afin d'éviter de transmettre l'infection.

Appliquez la crème avec le doigt, en débordant largement autour de la lésion.

Refermez le tube après emploi.

##### **Fréquence d'administration**

Espacez les applications au minimum de 3 à 4 heures.

Par exemple, appliquez la crème le matin après le petit-déjeuner, à midi après le déjeuner, vers 16-17h, le soir après le dîner et le soir avant le coucher.

##### **Durée du traitement**

**La durée d'utilisation est limitée à 10 jours.**

##### **Utilisation chez les enfants et les adolescents**

**N'utilisez pas cette crème chez l'enfant de moins de 6 ans.**

**Si vous avez utilisé plus de ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème que vous n'auriez dû**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez d'utiliser ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez d'utiliser ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Des sensations de picotements ou de brûlures passagères peuvent survenir après l'application de la crème.
- Chez quelques patients, la crème peut entraîner une rougeur, une sécheresse de la peau.
- Risque d'eczéma de contact au point d'application (notamment en raison de la présence de propylèneglycol) ; dans ce cas, arrêtez votre traitement et demandez l'avis de votre pharmacien ou de votre médecin.

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le tube.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

##### Ce que contient ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème

- La substance active est :

Aciclovir..... 5 g  
Pour 100 g de crème

- Les autres composants sont :

propylèneglycol, vaseline, paraffine liquide, macroglycérides stéariques, alcool cétyle, diméthicone, eau purifiée.

##### Qu'est-ce que ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de crème.

Tube de 2 g.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché****SANDOZ**

49, AVENUE GEORGES POMPIDOU  
92300 LEVALLOIS-PERRET

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché****SANDOZ**

49, AVENUE GEORGES POMPIDOU  
92300 LEVALLOIS-PERRET

**Fabricant****SALUTAS PHARMA GmbH**

OTTO-VON-GUERICKE-ALLEE 1  
39179 BARLEBEN  
ALLEMAGNE

Ou

**SALUTAS PHARMA GmbH**

BETRIEBSSTÄTTE OSTERWEDDINGEN  
LANGE GOHREN 3  
39171 SULZETAL, ORTSTEIL OSTERWEDDINGEN  
ALLEMAGNE

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

## CONSEILS / ÉDUCATION SANITAIRE

Les boutons de fièvre (ou herpès labial) sont dus à une infection provoquée par un virus appelé *herpes simplex*. Après une primo-infection, le virus persiste dans l'organisme sans entraîner de symptômes.

À l'occasion d'un événement comme la fatigue, les règles, la fièvre, une émotion ou une exposition solaire... le virus peut parfois être "réactivé" et provoquer l'apparition de vésicules (cloques) en bouquet autour des lèvres, appelées "bouton de fièvre". Ces vésicules sont contagieuses jusqu'à l'apparition des croûtes, signe de cicatrisation.

Il existe des signes avant-coureurs localisés au lieu habituel de la lésion, qui se traduisent généralement par une sensation de brûlure et/ou de picotements.

Ces signes sont importants à connaître :

- c'est dès leur apparition qu'il faut débuter le traitement qui empêche la multiplication virale et permet de prévenir ou de limiter l'évolution du bouton de fièvre,
- c'est aussi dès leur apparition qu'il faut respecter les règles d'hygiène qui vous sont données dans la rubrique "précautions d'emploi", afin de diminuer le risque de transmission du virus.

En revanche, l'aciclovir ne peut agir sur les virus qui persistent à l'état latent dans l'organisme, et l'aciclovir n'empêche pas la survenue de récurrences après l'interruption du traitement.